

Calcium and phosphorus serum levels in thalassemic patients with convulsion history, Bandar Abbas, Iran

A. Negahi, MD¹ M. Ashrafi MD²

Assistant Professor Department of Internal Medicine Hormozgan University of Medical Sciences¹, General Practitioner²

ABSTRACT

Introduction: Thalassemia is an important disease in East Mediterranean area and especially in Iran. The disease is more prevalent in Hormozgan province (South of Iran) than other parts of the country. Thalassemia has several complications including convulsion. In thalassemia patients, hypocalcaemia was correlated with hypoparathyroidism and is accompanied with convulsions. This study's aim was to determine the serum levels of calcium and phosphorus in thalassemic patients with a prior history of convulsion.

Methods: In this cross-sectional study, 607 major thalassemia, thalassemia intermedia and sickle thalassemia patients referred to thalassemia center of Bandar Abbas were sorted according to type of thalassemia, demographic data, presentation, and convulsion history. Level of calcium and phosphorus were detected with standard lab analysis methods. Fisher exact test and Chi-Square test were used to analyze the data.

Results: According to our findings, among 607 identified cases aged 12.2 ± 6.6 years, 46.1 percent (280 cases) were female and 53.9 percent (327 cases) were male. Prevalence of hypocalcaemia was 26.5% (95% CI, 23.1%-30.3%), prevalence of hyperphosphatemia was 37.4% and the prevalence of convulsion history was 9.9%. In spite of hypocalcaemia being more prevalent in thalassemia patients with convulsion, there was no significant difference between hypocalcemia in patients with prior history of convulsion and patients without convulsion.

Conclusion: This study shows indirect relation between prevalence of hypocalcaemia and hyperphosphatemia in thalassemic patients with or without convulsion and direct correlation between severity of thalassemic and convulsion history.

Key words: Calcium – Phosphorus – Thalassemia – Seizures - Bandar Abbas

Correspondence:

A. Negahi, MD.

Department of Internal Medicine Shahid Mohammadi Hospital Hormozgan University of Medical Sciences Bandar Abbas, Iran.

Tel: +98 761 3347001

Email:

rnegahi@hums.ac.ir

سطح سرمی کلسیم و فسفر در بیماران تالاسمیک با سابقه تشنج در شهر بندرعباس

دکتر احمد نگهی^۱ دکتر مریم اشرفی^۲

^۱ استادیار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان^۲ پژوهش عمومی

مجله پزشکی هرمزگان سال دهم شماره اول بهار ۸۵ صفحات ۸-۱۵

چکیده

مقدمه: تالاسمی یکی از بیماریهای مهم منطقه مدیرانه شرقی و از جمله کشور ما می‌باشد که در استان هرمزگان نیز شیوع بالایی دارد. تالاسمی دارای عوارض متعددی از جمله تشنج می‌باشد و همراهی و ارتباط هیپوکلسیمی در افراد تالاسمیک با هیپوپاراتیروئیدیسم و تشنج آنها دیده شده است. این مطالعه با هدف بررسی تغییرات سطح سرمی کلسیم و فسفر بیماران تالاسمی دارای سابقه تشنج انجام شده است.

روش کار: مطالعه انجام شده به صورت یک مطالعه مقطعی بر روی ۶۰ بیمار مبتلا به تالاسمی مأمور تالاسمی اینترمیا و سیکل تالاسمی که به مرکز تالاسمی بمندرجۀ کردانه، انجام شده است. اطلاعات دموگرافی و اطلاعات مربوط به وضعیت بیماری تالاسمی و سابقه تشنج در بیماران جمع‌آوری شد. سطح سرمی کلسیم و فسفر بیماران توسط روش‌های آزمایشگاهی اندازه گیری شد. نتایج با استفاده از آزمون آماری کای اسکوئر و آزمون دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج: این مطالعه بر روی ۷۰ نفر از بیماران مبتلا به تالاسمی صورت گرفت که از این تعداد ۲۸ نفر (۴۶٪) مونث و ۳۲۷ نفر (۵۳٪) مذکور بودند و میانگین سنی کل بیماران برابر با ۱۲/۲±۰/۶ سال بود. مطالعه حاضر شیوع هیپوکلسیمی را ۲۶/۵٪ و شیوع هیپرفسفاتمی را ۳۷/۴٪ و نیز شیوع تشنج را ۹/۹٪ در بیماران تالاسمیک مورد مطالعه نشان داد. با وجود شیوع بیشتر هیپوکلسیمی در بیماران تالاسمیک با سابقه تشنج تفاوت معنی‌دار آماری بین شیوع هیپوکلسیمی در بیماران تالاسمیک با و بدون سابقه تشنج بدست نیامد.

نتیجه‌گیری: این مطالعه مشخص کرد که تفاوت مشخصی در میزان شیوع هیپوکلسیمی و نیز هیپرفسفاتمی در دو گروه بیماران تالاسمیک با و بدون سابقه تشنج وجود ندارد اما ارتباط مستقیم مشخص بین شدت بیماری و بروز تشنج در بیماران تالاسمی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: کلسیم - فسفر - تالاسمی - تشنج - بندرعباس

نویسنده مسئول:
دکتر احمد نگهی
بخش داخلی بیمارستان
شهید محمدی دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان
بندرعباس - ایران
تلفن: +۹۸ ۷۶۱ ۳۳۴۷-۰۱
پست الکترونیکی:
anegahi@hums.ac.ir

دربافت مقاله: ۸۳/۱۰/۸ اصلاح نهایی: ۸۴/۹/۱۳ پذیرش مقاله: ۸۴/۹/۲۰

مقدمه: کیسه صفراء، اختلالات اندوکرینی متعدد و تشنج (۱). در

حالی که شیوع تشنج در جمعیت عمومی بین ۵ تا ۱۰ درصد است، تشنج در ۱۳٪ افراد تالاسمیک دیده می‌شود (۲). نشان داده شده که شیوع هیپوکلسیمی در افراد تالاسمیک بیش از افراد سالم می‌باشد (۳). همراهی و ارتباط هیپوکلسیمی در افراد تالاسمیک با هیپوپاراتیروئیدیسم آنها هم دیده شده است. همچنین مطالعات نشان داده‌اند که تشنج در جمعیت تالاسمیک مبتلا به هیپوکلسیمی شایعتر است (۴).

اختلالات کلسیم و فسفر که به علت عوارض ناشی از بیماری تالاسمی ایجاد می‌شود (۳,۵,۶,۷)، منجمله عوارض

سندروم‌های تالاسمی، اختلالات ارشی در بیوستنتز گلوبین α یا β هستند. در واقع تالاسمی به گروهی از بیماری‌های خونی اطلاق فمی‌شود که شاخص آن، کاهش سنتز یکی از دو زنجیره پلی‌پیتیدی (α یا β) است که مولکول هموگلوبین نرمال را تشکیل می‌دهند و نتیجه آن کاهش هموگلوبین گلbul‌های قرمز و نهایتاً آنی است (۱). تالاسمی یکی از بیماری‌های مهم منطقه مدیرانه شرقی و از جمله کشور ما می‌باشد که در استان هرمزگان نیز شیوع بالایی دارد.

تالاسمی دارای عوارض متعددی می‌باشد. از جمله تغییر شکل استخوانهای صورت، هپاتوسیلنومگالی، سنگ

داده‌های حاصله از پرونده‌های مرکز تالاسمی و داده‌های حاصله از پرسشنامه‌هایی که توسط بیماران تکمیل شده بود، به همراه نتایج آزمایشات توسط نرم‌افزار Epi Info (Version3.2.2) آنالیز آماری شد و جهت مقایسه از آزمونهای Chi-square و Fisher-Test استفاده گردید.

نتایج:

این مطالعه بر روی ۶۰۷ نفر از بیماران مبتلا به تالاسمی مراجعه کننده به مرکز تالاسمی بندرعباس در مقطع زمانی فروردین ۱۳۸۲ تا فروردین ۱۳۸۳ صورت گرفت که از این تعداد ۲۸۰ نفر (۴۶/۱٪) مونث و ۳۲۷ نفر (۵۳/۹٪) مذکر بودند. جمعیت مورد مطالعه میانگین سنی برابر با $۱۲/۱ \pm ۷/۱$ سال داشتند ($۱۲/۱ \pm ۲/۶$ سال برای جنس مذکر).

از ۶۰۷ نفر جمعیت مورد مطالعه ۱۲۴ نفر (۲۰/۴٪) مبتلا به تالاسمی اینترمیدیت، ۴۱ نفر (۷۲/۷٪) مبتلا به تالاسمی ماذور، ۴۲ نفر (۶/۹٪) مبتلا به سیکل تالاسمی بودند.

میانگین دفعات تعویض خون در هر ماه و میانگین مصرف دسپرال (میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن) و میانگین دفعات مصرف دسپرال در هر هفته در سه گروه مبتلا به تالاسمی ماذور، تالاسمی اینترمیدیت و سیکل تالاسمی تقاضت معنی‌داری داشت و در هر سه مورد در تالاسمی ماذور بیشتر از تالاسمی اینترمیدیت و در تالاسمی اینترمیدیت بیشتر از سیکل تالاسمی بدست آمد ($P < 0.05$). (جدول شماره ۱).

جدول شماره ۱- میانگین دفعات تعویض خون، مصرف دوز و دفعات مصرف دسپرال در بیماران تالاسمی مورد مطالعه

میانگین دفعات صرف دسپرال در هر هفته	میانگین دفعات دسپرال میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن	میانگین دفعات تعویض خون در ماه	تالاسمی ماذور
۵/۹	۲/۷	۱/۷	تالاسمی ماذور
۴/۸	۲/۵	۱/۳	تالاسمی اینترمیدیت
۱/۷	۱	۰/۷	سیکل تالاسمی

ناشی از هموسیدروز (۱۱، ۱۰، ۸، ۹) نیز میتواند در بروز تشنج در این بیماران نقش داشته باشد (۴).

البته تشنج بعد از تعویض خون‌های مکرر (۱۲) و در مراحل پیشرفتی بیماری به دنبال ضایعات اکسترامدولاری نیز دیده می‌شود (۱۳).

با توجه به شیوع بالای انواع تالاسمی در استان هرمزگان انجام مطالعات بیشتر در این زمینه در جهت پیشگیری از عوارضی مانند تشنج، مطمئناً کمک شایانی در تسخیل الام این بیماران و کاهش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی تحمل شده به خانواده‌ها و جامعه خواهد بود. این مطالعه با این هدف به بررسی تغییرات سطح سرمی کلسم و فسفر بیماران تالاسمی دارای سابقه تشنج پرداخته است.

روش کار:

مطالعه انجام شده به صورت یک مطالعه مقطعی از فروردین ماه ۱۳۸۲ تا فروردین ۱۳۸۳ بر روی ۶۰۷ بیمار مبتلا به تالاسمی ماذور، تالاسمی اینترمیدیا و سیکل تالاسمی که به مرکز تالاسمی بندرعباس مراجعه کرده‌اند، انجام شده است. همه این بیماران دارای پرونده پزشکی در این مرکز هستند و بیماری آنها بر اساس الکتروفورز تشخیص داده شده و به سه نوع تالاسمی ماذور، تالاسمی اینترمیدیت و سیکل تالاسمی طبقه بندی شده‌اند.

اطلاعات دموگرافی و اطلاعات مربوط به وضعیت بیماری تالاسمی آنها شامل نوع بیماری، دفعات تعویض خون (در ماه)، نحوه مصرف دسپرال (مقدار و دفعات مصرف در هر هفته) استخراج گردید. همچنین اطلاعات سابقه تشنج آنها، تعدد تشنج در هر ماه و مدت تشنج و نیز وضعیت داروی ضد تشنج مصرفی و سابقه ابتلاء به تشنج در خانواده گردآوری شد و تشنج توسط متخصص مغز و اعصاب با توجه به یافته‌های کلینیکی و EEG تأیید شد. سطح سرمی کلسم و فسفر بیماران توسط روش‌های استاندارد آزمایشگاهی اندازه‌گیری شد. در منابع مختلف ذکری از زمان خونگیری و زمان تشنج بیان نشده است. بنابراین نمونه‌ها بصورت تصادفی در همه گروهها گرفته شد. نمونه‌ها بلافاصله پس از تهیه به آزمایشگاه منتقل و مورد ارزیابی قرار گرفت.

نداشتند، اندازه‌گیری شد. نتایج حاصله از این اندازه‌گیری به تفکیک نوع بیماری تالاسمی در جمعیت مورد مطالعه و نیز وجود یا عدم وجود سابقه تشنج در جدول شماره ۲ و جدول شماره ۳ آورده شده است.

در این مطالعه جهت بررسی و مقایسه، سطح سرمی کلسیم طبیعی $8/5 - 10/5$ (مقادیر $8/5 \geq 10/5 \leq$) میلی‌گرم در دسی‌لیتر در نظر گرفته شد. مقادیر کمتر از $8/5$ میلی‌گرم در دسی‌لیتر، هیپوکلسیمی و مقادیر بیشتر از $10/5$ میلی‌گرم در دسی‌لیتر، هیپرکلسیمی محاسبه شد که مقادیر فوق بر اساس استاندارد کیت‌های مصرفی تهیه شده مورد محاسبه قرار گرفت.

در مورد سطح سرمی فسفر مقادیر طبیعی را $4 - 5/5$ (مقادیر $4 \geq 5/5 \leq$) میلی‌گرم در دسی‌لیتر در نظر گرفتیم و مقادیر کمتر از 4 میلی‌گرم در دسی‌لیتر را هیپوفسفاتمی و مقادیر بیشتر از $5/5$ میلی‌رم در دسی‌لیتر را هیپر فسفاتمی در نظر گرفتیم. فراوانی سطوح سرمی طبیعی، بالا و پایین کلسیم و فسفر نیز در جمعیت مورد مطالعه محاسبه شد (جدول شماره ۲ و شماره ۳).

میانگین سنی نیز در سه گروه فوق تفاوت معنی‌داری داشت و در افراد تالاسمی مازور کمتر از تالاسمی ایترمیدیت و در تالاسمی ایترمیدیت کمتر سیکل تالاسمی بود ($P < 0.001$).

از $60/7$ نفر جمعیت مورد مطالعه $60/9\%$ (۶۰ نفر) با فاصله اطمینان $95\%: 12/6 - 7/7$ ٪ سابقه تشنج را ذکر می‌کردند.

از 60 نفر افراد دارای سابقه مثبت تشنج 29 نفر مونث ($10/4$ ٪ افراد مونث مطالعه) و 21 نفر مذکر ($9/5$ ٪ افراد مذکر مطالعه) بودند که تفاوت معنی‌داری از لحاظ شیوع تشنج در دو جنس وجود نداشت.

میانگین سنی افرادی که تشنج داشته‌اند $13/5 \pm 6/4$ سال و در افرادی که تشنج نداشته‌اند $12 \pm 6/6$ سال بدست آمد که تفاوت بین آنها معنی‌دار نبود. از لحاظ فراوانی تشنج در سه گروه بیماری مورد مطالعه، شیوع تشنج در بیماران تالاسمی مازور با $12/5\% (55/441)$ نفر بطور معنی‌داری بیشتر از بیماران تالاسمی ایترمیدیت ($4/124\% (4/42)$ نفر) و سیکل تالاسمی ($2/4\% (1/42)$ نفر) بود ($P < 0.002$).

نیمی از بیماران مبتلا به تشنج سابقه فامیلی تشنج را ذکر می‌کردند و نیمی دیگر سابقه خانوادگی مثبت تشنج را نداشتند.

سطح سرمی کلسیم و فسفر برای تمام جمعیت مورد مطالعه چه آنان که سابقه تشنج داشتند و یا سابقه تشنج

جدول شماره ۲- فراوانی سطح کلسیم سرم در بیماران تالاسمیک مورد مطالعه به تفکیک نوع تالاسمی و وجود یا عدم وجود سابقه تشنج

نوع تالاسمی	بیماران					
	بیماران بدون سابقه تشنج			بیماران با سابقه تشنج		
هیپرکلسیمی	کلسیم طبیعی	هیپوکلسیمی	هیپرکلسیمی	کلسیم طبیعی	هیپوکلسیمی	هیپوکلسیمی
تالاسمی مازور						
(۲/۵) ۱۱	(۶۹/۸) ۴۶۸	(۷۷/۷) ۱۰۷	.	(۶۷/۲) ۳۷	(۳۲/۷) ۱۸	
تالاسمی ایترمیدیت						
(۱/۷) ۲	(۷۷/۵) ۹۳	(۲۰/۸) ۲۵	.	(۵۰) ۲	(۵۰) ۲	
سیکل تالاسمی						
(۲/۵) ۱	(۷۸) ۳۲	(۱۹/۵) ۸	.	.	(۱۰۰) ۱	
جمع	(۷۱/۸) ۳۹۳	(۲۵/۶) ۱۴۰	.	(۴۵) ۳۹	(۳۵) ۲۱	

جدول شماره ۳- فراوانی سطح فسفر سرم در بیماران تالاسمیک مورد مطالعه به تفکیک نوع تالاسمی و وجود یا عدم وجود سابقه تشنج

نوع تالاسمی	بیماران					
	بیماران بدون سابقه تشنج			بیماران با سابقه تشنج		
هیپرفسفاتمی	فسفر طبیعی	هیپوفسفاتمی	هیپرفسفاتمی	فسفر طبیعی	هیپوفسفاتمی	هیپوفسفاتمی
تالاسمی مازور						
(۳۸/۱) ۱۴۷	(۶۰/۴) ۲۲۳	(۱/۶) ۶	(۳۸/۲) ۲۱	(۶۱/۸) ۳۴	.	
تالاسمی ایترمیدیت						
(۳۸/۳) ۴۶	(۶۱/۷) ۷۴	.	(۵۰) ۲	(۵۰) ۲	.	
سیکل تالاسمی						
(۳۴/۴) ۱۰	(۷۵/۶) ۳۱	.	(۱۰۰) ۱	.	.	
جمع	(۶۱/۸) ۳۲۸	(۱/۱) ۶	(۴۰) ۲۴	(۴۰) ۲۶	.	

بحث و نتیجه‌گیری:

تالاسمی به گروهی از بیماری‌های خونی اطلاق می‌شود که شاخص آن، کاهش سنتز یکی از دو زنجیره پلی‌پپتیدی (α یا β) است که مولکول هموگلوبین نرمال را تشکیل می‌دهند و نتیجه آن کاهش هموگلوبین گلبول‌های قرمز و نهایتاً آنمی است (۱).

تعویض خونهای مکرر و به دنبال آن اختلال در متابولیسم الکترولیتها عوارض متعددی را به دنبال خواهد داشت (۲،۳،۵،۶). اختلال در متابولیسم فسفر و کلسیم به عنوان یکی از علل بروز عارضه تشنج در این بیماران مطرح می‌باشد (۴).

شیوع تشنج در این بیماران در مراجع مختلف تا ۱۲٪ بیان شده است که بیش از جمعیت عموم که بین ۰.۵٪ تا ۱٪ است، می‌باشد (۲).

جمعیت مورد مطالعه میانگین سنی برابر با 12.2 ± 6.6 سال داشتند که در مقایسه با سایر مطالعات (۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷) میانگین سنی بیماران مورد مطالعه ما چند سال کمتر می‌باشد که خود می‌تواند بر نتایج حاصله بر مطالعه ما اثر گذاشته باشد زیرا برخی از عوارض بیماری تالاسمی وابسته به گذشت زمان و افزایش میزان تزریق خون می‌باشد.

تحقیق اخیر به مطالعه ۶۰۷ بیمار تالاسمی در شهر بندرعباس پرداخته است که از این میان ۶۰ نفر از بیماران مبتلا به تشنج بودند که شیوع برابر 9.9% ($60.7/607$) را برای تشنج در بیمارات تالاسمیک این شهر نشان می‌دهد که سطح قابل انتظار از لحاظ تطبیق بر مطالعات قبلی می‌باشد.

شیوع بیشتر تشنج در بیماران تالاسمی مژوزر (۱۲/۵٪) که بطور مشخص بیش از بیماران تالاسمی اینترمیدیت ($2/3\%$) و سیکل تالاسمی ($2/4\%$) می‌باشد ($P < 0.002$) نشان از آن دارد که ارتباط مستقیمی بین شدت بیماری و بروز عوارض منجمله تشنج وجود دارد. اگر چه بررسی میانگین ماهانه نیاز به تزریق خون در بیماران تالاسمی مژوزر بیش از سایر انواع تالاسمی بود ($P < 0.0001$) ولی با این وجود این مطالعه تفاوت معنی‌داری را لحاظ میانگین ماهانه نیاز به تزریق خون بین بیماران مبتلا به تشنج و غیر مبتلا به تشنج را نشان نداد.

نتایج نشان داد که اگر چه شیوع نسبتاً بیشتری از هیپوکلسیم در بیماران تالاسمی مژوزر نسبت به بیماران تالاسمی اینترمیدیت و سیکل تالاسمی وجود دارد (بترتیب $28/3\%$ نسبت به $21/8\%$ و $21/4\%$) اما این اختلاف، اختلاف معنی‌داری نیست.

بررسی سطح سرمی کلسیم در مبتلایان به تشنج نشان داد که در $35\% (21/60)$ نفر از این افراد هیپوکلسیم وجود دارد. اگر چه این فراوانی نسبت به شیوع $25/6\% (140/547)$ هیپوکلسیم در افراد تالاسمیک بدون سابقه تشنج درصد بیشتری را نشان می‌دهد ولی این تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد.

محاسبات سطح سرمی برای فسفر نیز انجام گرفت نتایج نشان داد که سطوح هیپروفسفاتمی، هیپوفسفاتمی و سطح طبیعی فسفر در جمعیت تالاسمیک مورد مطالعه به ترتیب $4/37\% (27/607)$ ($6/61$ نفر)، $1/227\% (6/607)$ ($1/61$ نفر) و $4/607\% (37/607)$ می‌باشد.

مقایسه سطوح سرمی فسفر نیز هیچگونه تفاوت معنی‌داری را بین سطوح سرمی فسفر در سه گروه بیماری تالاسمی مژوزر، تالاسمی اینترمیدیت و سیکل تالاسمی نشان نداد ($P = 0.2997$) (جدول شماره ۳).

از افرادی که سابقه تشنج داشته‌اند (60 نفر) 24% ($14/60$) دارای سطح فسفر خون $> 5/5$ (هیپروفسفاتمی) نفر ($6/60$) دارای سطح فسفر $4-5/5$ (طبیعی) بودند در حالی هیچ‌کدام از این افراد، دارای سطح فسفر < 4 (هیپوفسفاتمی) نبودند. بررسی مقایسه‌ای نشان داد که هیچ گونه ارتباط معنی‌داری بین سطح فسفر سرم و بروز تشنج در بیماران تالاسمی وجود ندارد.

بررسی سطوح مختلف کلسیم و فسفر در جمعیت مورد نظر به تفکیک جنس نیز تفاوت معنی‌داری را نشان نداد.

جهت بررسی اثرات تزریق خون مکرر، میانگین تزریق خون در هر ماه برای بیماران با و بدون سابقه تشنج محاسبه شد که بر این اساس میانگین تعداد تزریق خون در هر ماه افراد دارای سابقه تشنج برابر $1/6 \pm 0.5$ بار در هر ماه و برای افرادی تالاسمیک بدون سابقه تشنج برابر $1/5 \pm 0.7$ بار در هر ماه بدست آمد.

بروز هیپوکلسیم و تشنج را در بیماران تالاسمی پیدا نکردند (۱۶، ۲۴، ۲۵، ۲۶). بنابراین میتوان نقش عوامل دیگری علاوه بر هیپوکلسیم را در بروز تشنج در بیماران تالاسمی مطرح کرد.

سطح سرمی فسفر که متابولیسم آن مرتبط با متابولیسم کلسیم و تحت تأثیر غده پاراتیروئید میباشد نیز در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. فراوانی سطوح هیپرفسفاتیمی، هیپوفسفاتیمی و سطح طبیعی فسفر در جمعیت تالاسمیک دارای سابقه تشنج مورد مطالعه به ترتیب ۴٪ (۲۴/۶۰ نفر)، ۶٪ (۳۶/۶۰ نفر) و صفر درصد بودست آمد. اگر چه شیوع هیپرفسفاتیمی در بیماران تالاسمیک دارای سابقه تشنج نسبت به شیوع ۳۷/۱٪ (۲۰۳/۵۴۷ نفر) هیپرفسفاتیمی در بیماران تالاسمیک بدون سابقه تشنج از میزان بالاتری برخودار است ولی این اختلاف معنی دار نمیباشد.

نهایتاً میتوان گفت که مطالعه حاضر به جهت آن که جمعیت بیشتری از بیماران تالاسمی را بررسی کرده بود، از مزیت خاصی برخوردار است.

اگر چه ما در این مطالعه هیپوپاراتیروئیدیسم را شاخص جهت مطالعه برای وجود عوارض بیماری تالاسمی قرار ندادیم و تنها به وجود هیپوکلسیم به عنوان نشانه ای از عارضه هیپوپاراتیروئیدیسم بسته کردیم اما نهایتاً دریافتیم که به لحاظ آماری تقاضت معنی داری در میزان شیوع هیپوکلسیم و نیز هیپرفسفاتیمی در دو گروه بیماران تالاسمیک با و بدون سابقه تشنج وجود ندارد ولی در مطالعات بعدی بهتر است سطح سرمی هورمون پاراتیروئید و آلبومین مدنظر قرار گیرد.

از سویی دیگر این مطالعه نشان داد که ارتباط مستقیم مشخص بین شدت بیماری و بروز تشنج در بیماران تالاسمی وجود دارد بطوری که شیوع تشنج در بیماران تالاسمی مژهور که ۱۲/۵٪ (با فاصله اطمینان ۹/۶٪، برابر با ۱۶٪ تا ۹/۶٪) میباشد بطور معنی داری بیش از شیوع تشنج در بیماران تالاسمی اینترمیدیت (۲/۳٪) و سیکل تالاسمی (۲/۲٪) است (P < ۰/۰۰۲).

با وجود عدم یافتن ارتباط معنی داری بین تشنج و وجود هیپوکلسیم در بیماران تالاسمیک تحت مطالعه، باید توجه داشت که مطالعه حاضر وجود شیوع هیپوکلسیم (۲۶/۵٪) با فاصله اطمینان ۹۵٪، برابر با

به این ترتیب میتوان گفت که احتمالاً بدليل ترانسفیوژن های طولانی مدت و بیشتر، در افراد تالاسمی مژهور، افزایش بیش از حد آهن در این افراد بیشتر بوده و عوارض ناشی از آن (هموسیدوز در غدد اندوکرین و ارگانهای مهم بدن) در این بیماران بیشتر است (۱۰، ۱۸، ۱۹، ۲۰). از جمله غدی که به علت بروز هموسیدوز چهار مشکل میشوند، غده پاراتیروئید است (۸، ۹، ۱۰) که باعث هیپوپاراتیروئیدیسم و در نتیجه ایجاد اختلال در مقادیر کلسیم و فسفر خون شود (۴، ۱۱، ۲۱).

بررسی فراوانی سطوح سرمی کلسیم نشان داد که اگر چه شیوع نسبتاً بیشتری از هیپوکلسیم، به عنوان یکی از علل بروز تشنج در بیماران تالاسمیک، در بیماران تالاسمی مژهور نسبت به بیماران تالاسمی اینترمیدیت و سیکل تالاسمی وجود دارد (ترتیب ۲۸/۳٪ نسبت به ۲۱/۸٪ و ۲۱/۴٪) اما این اختلاف، اختلاف معنی داری نیست.

مطالعات دیگری که اکثراً بر روی بیماران تالاسمی مژهور انجام شده نشان میدهد که شیوع هیپوپاراتیروئیدیسم در این بیماران متفاوت بوده و به ارقامی بین ۶٪ تا ۱۰٪ اشاره می کنند (۲۲، ۲۳) که تقریباً یک سوم شیوع هیپوکلسیم در بیماران تالاسمی مژهور مورد مطالعه ما میباشد.

مقایسه فراوانی هیپوکلسیم در بیماران تالاسمیک مبتلا به تشنج و غیر مبتلا به تشنج نیز نشان داد که اگر چه هیپوکلسیمی در بیماران مبتلا به تشنج (۳۵٪) از شیوع بیشتری نسبت به بیماران غیر مبتلا به تشنج (۲۵/۶٪) برخوردار است اما این برتری از نظر آماری معنی دار نمیباشد.

مطالعات دیگری که به بررسی هیپوپاراتیروئیدیسم، هیپوکلسیمی و ارتباط آن با بروز تشنج در بیماران تالاسمی پرداخته اند مانند مطالعه Gertner و همکاران (۱۶) در سال ۱۹۷۹، مطالعه Soliman و همکارانش (۱۷)، مطالعه Pratico و همکارانش (۵)، مطالعه Kinnery و همکارانش (۲۴) در سال ۱۹۹۹، مطالعه Kaumann و همکارانش (۲۵) در سال ۱۹۹۱ و یا مطالعه ای که در سال ۱۹۹۴ در هنگ کنگ انجام گرفت (۲۶) همگی با وجود تأکید بر بروز هیپوپاراتیروئیدی و هیپوکلسیمی ناشی از عوارض بیماری تالاسمی بویژه تزریق خون های مکرر، هیچ کدام از این مطالعات ارتباطی را بین این

سپاسگزاری:

از مسئولین و همکاران مرکز تالاسمی شهر بندرعباس بخاطر مساعدت در اجرای این پژوهش قدردانی می‌نماییم.

۲۳/۱٪ تا ۳۰/۳٪) و شیوع هیپرفسفاتمی ۴/۳٪ (با فاصله اطمینان ۹۵٪، ۴۱/۴٪-۴۲/۶٪) و نیز وجود شیوع تشنج ۹/۹٪ (با فاصله اطمینان ۹۵٪، ۱۲/۶٪-۷/۷٪) را در بیماران تالاسمیک مورد مطالعه نشان داده است که به عنوان عوارض مهم بیماری تالاسمی نیاز به بررسی های بیشتر دارند تا از عوارض بعدی آنها برای بیماران تالاسمی جلوگیری کرد.

References**منابع**

1. Benz Jr EJ. Hemoglobinopathies. In: Braunwald E, Fauci A, Kasper D, Hauser S, Longo D, Jameson JL, eds. *Harrison's principles of internal medicine*. 15th ed. New York: Mc Graw-Hill; 2001;672-673.
2. Pedley TA, Bazil CW, Morrell MJ. Epilepsy. In: Rowlond LP (ed). *Merritt's neurology*. Philadelphia: Lipincott Williams and Wilkins; 2000:813-833.
3. Aloia JF, Ostuni JA, Yeh JK, Zaino EC. Combined vitamin D parathyroid defect in thalassemia major. *Arch Intern Med*. 1982;142(4):831-832.
4. Shu SG, Mak SC, Chen YC, CHI CS. Familial primary hypomagnesemia complicated with brain atrophy and cardiomyopathy. *Acta Paed Sin*. 1997;38(4):293-296.
5. Pratico G, Di Gregorio F, Caltabiano L, Palano GM, Caruso-Nicoletti M. Calcium phosphate metabolism in thalassemia. *Pediatr Med Chir*. 1998;20(4):265-268.
6. Duran MJ, Borst GC, Osburne RC, Eil C. Concurrent renal hypomagnesemia and hypoparathyroidism with normal parathormone responsiveness. *Am J Med*. 1984;76(1):151-154.
7. Kalam MA, Hafeez W. Congenital hypoparathyroidism, seizure, extreme growth failure with developmental delay and dysmorphic features—another case of this new syndrome. *Clin Genet*. 1992;42(3):110-113.
8. Bianchi C, Carcano G, Pradella C, Proverbio MC, Weber G, Mazzucchelli M, et al. Biochemical data in the phosphate depletion syndrome of thalassemic patient. *Pediatr Med Chir*. 1981;3(1):15-21.
9. de Montalembert M, Guillemot F, Clairicia M, Girot R. Iron chelation in children. *Ann Pediatr (Paris)*. 1989;36(8):533-538.
10. Perignon F, Brauner R, Souberbielle JC, de Montalembert M, Girot R. Growth and endocrine function in major thalassemia. *Arch Fr Pediatr*. 1993;50(8):657-663.
11. Tso SC, Loh TT, Chen WW, Wang CC, Todd D. Iron overload in thalassemic patients in Hong Kong. *Ann Acad Med Singapore*. 1998;13(3):487-490.
12. Wasi P, Na-Nakorn S, Putrakul P, Sonakul D, Piankijagum A, Pacharee P. A syndrome of hypertension, convulsion and cerebral hemorrhage in thalassemic patients after multiple blood-transfusions. *Lancet*. 1987;16;2(8090):602-604.
13. Dhechakaisaya S, Shuangshoti S, Susakares A. Extramedullary hematopoiesis of cranial dura mater and choroid plexus and terminal convulsions in a patient with thalassemia-hemoglobin E disease. *J Med Assoc Thai*. 1979;62(9):503-511.

14. Karimi M, Habibzadeh F, De Sanctis V. Hypoparathyroidism with extensive intracerebral calcification in patients with beta-thalassemia major. *J Pediatr Endocrinol Metab.* 2003;16(6):883-886.
15. Chern JP, Lin KH. Hypoparathyroidism in transfusion-dependent patients with beta-thalassemia. *J Pediatr Hematol Oncol.* 2003;25(3):275-276.
16. Gertner JM, Broadus AE, Anast CS, Grey M, Pearson H, Genel M. Impaired parathyroid response to induced hypocalcemia in thalassemia major. *J Pediatr.* 1979;95(2):210-213.
17. Soliman AT, EL Banna N, Abdel Fattah M, Elzalabani MM, Ansari BM. Bone mineral density in prepubertal children with beta-thalassemia: Correlation with growth and hormonal data. *Metabolism.* 1998;47(5):541-548.
18. Albo C, Cabrera J, Dios A, Castro M, Ares C, Constenla I. Program of hypertransfusion and chelation with desferrioxamine in 10 patients with thalassemia major. *Sangre Barc.* 1995;40(6):441-445.
19. Brandle M, Galeazzi RL, Morant R, Oesterle M. Osteopenia in beta-thalassemia major. *Schweiz Med Wochenschr.* 1996;126(44):1867-1874.
20. Hyman CB, Ortega JA, Costin G, Takahashi M. The clinical significance of magnesium depletion in thalassemia. *Ann NY Acad Sci.* 1980;344:436-443.
21. Gurgey A, Kalayci O, Gumruk F, Cetin M, Altay C. Convulsion after blood transfusion in four beta-thalassemia intermedia patients. *Pediatr Hematol Oncol.* 1994;11(5):549-552.
22. Chern JP, Lin KH. Hypoparathyroidism in transfusion-dependent patients with beta-thalassemia. *J Pediatr Hematol Oncol.* 2002;24(4):291-293.
23. Abdollah Shamshirsaz A, Bekheirnia MR, Kamgar M, Pourzahedgilani N, Bouzari N, Habibzadeh M, et al. Metabolic and endocrinologic complications in beta-thalassemia major: a multicenter study in Tehran. *BMC Endocr Disord.* 2003;3(1):4.
24. Kinney TR, Sleeper LA, Wang WC, Zimmerman RA, Pegelow CH, Ohene-Frempong K, et al. Silent cerebral infarcts in sickle cell anemia: a risk factor analysis. *Pediatrics.* 1999;103(3):640-645.
25. Kaufmann T, Coleman M, Giardina P, Nisce LZ. The role of radiation therapy in the management of hematopoietic neurologic complications in thalassemia. *Acta Haematol.* 1991;85(3):156-159.
26. Rodriguez Galindo C, Ortega Aramburu JJ, Albisu M, Alonso JL, Casaldaliga J, Diaz de Heredia C, et al. Evaluation of the efficacy of chelation therapy with deferoxamine in patients with thalassemia major. *Med Clin Barc.* 1994;102(19):721-724.